

L8 ANSWER 3 OF 7 WPINDEX COPYRIGHT 2004 THE THOMSON CORP on STN

AN 2003-470707 [45] WPINDEX

DNC C2003-125917

TI New N-(aza-bicycloalkyl)-benzo-heterocyclic carboxamides, useful as Alpha-7-nicotinic acetylcholine receptor ligands for e.g. improving attention, concentration, learning and/or memory performance.

DC B02

IN BOSS, F; ERB, C; HENDRIX, M; KRUGER, J; LUTHLE, J; METHFESSEL, C; SCHREIBER, R; WIESE, W; BOESS, F; KRUEGER, J

PA (FARB) BAYER AG; (FARB) BAYER HEALTHCARE AG

CYC 102

PI DE 10156719 A1 20030528 (200345)* 15

WO 2003043991 A1 20030530 (200345) GE <--

RW: AT BE BG CH CY CZ DE DK EA EE ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW MZ NL OA PT SD SE SK SL SZ TR TZ UG ZM ZW

W: AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ OM PH PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AU 2002349021 A1 20030610 (200419)

EP 1448530 A1 20040825 (200456) GE

R: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI SK TR

ADT DE 10156719 A1 DE 2001-10156719 20011119; WO 2003043991 A1 WO 2002-EP12375 20021106; AU 2002349021 A1 AU 2002-349021 20021106; EP 1448530 A1 EP 2002-781305 20021106, WO 2002-EP12375 20021106

FDT AU 2002349021 A1 Based on WO 2003043991; EP 1448530 A1 Based on WO 2003043991

PRAI DE 2001-10156719 20011119

AN 2003-470707 [45] WPINDEX

AB DE 10156719 A UPAB: 20030716

NOVELTY - N-(Aza-bicycloalkyl)-benzo-heterocyclic carboxamides (I) are new.

DETAILED DESCRIPTION - N-(Aza-bicycloalkyl)-benzo-heterocyclic carboxamides of formula (I) and their salts, hydrates and/or solvates are new;

R1 = aza-bicyclo(m.n.o)alkyl with 7-11 ring atoms (optionally substituted by 1-6C alkyl);
m, n, o = 0-3;

ring A = pyrimido; or pyrido, pyridazo or pyridazino (all optionally benzo-fused);

R2, R3 = H, halo, CHO, CONH2, CN, CF3, OCF3, NO2, 1-6C alkyl, 1-6C alkoxy, 1-6C alkylthio, 3-8C cycloalkyl or 4-8 membered heterocyclyl; or phenyl or 5- or 6-membered heteroaryl (both optionally substituted by halo, 1-4C alkyl, 1-6C alkoxy, NH2, mono- or di-(1-4C) alkylamino, 1-4C alkanoylamino or 1-4C alkanesulfonylamino).

An INDEPENDENT CLAIM is also included for the preparation of (I).

ACTIVITY - Nootropic; Neuroprotective; Cerebroprotective; Tranquilizer; Antiparkinsonian; Anticonvulsant; Anti-HIV; Neuroleptic; Analgesic.

MECHANISM OF ACTION - alpha 7-Nicotinic Acetylcholine Receptor (alpha 7-nAChR) Ligand; alpha 7-nAChR Agonists.

USE - (I) are used as medicaments, specifically for improving attention, concentration, learning and/or memory performance or for the treatment and/or prophylaxis of attention, concentration, learning and/or memory disorders (all claimed). More generally (I) are useful for the treatment and/or prevention of cognitive disorders, e.g. Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, age-associated learning or memory disorders, vascular dementia, cranial-cerebral trauma, stroke, post-stroke trauma, general concentration deficiency, attention deficit hyperactivity syndrome, dementia with Lewy bodies or degeneration of the frontal lobes, Pick's disease, Parkinson's disease, progressive nuclear palsy, amyotrophic lateral sclerosis, Huntington's disease, multiple sclerosis,

thalamic degeneration, Creutzfeld-Jacob disease, HIV dementia, schizophrenia, schizophrenia with dementia or Korsakoff psychosis. (I) are also useful for the treatment and/or prophylaxis of acute and/or chronic pain, e.g. cancer-induced pain or chronic neuropathic pain.
Dwg.0/0

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. Mai 2003 (30.05.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/043991 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C07D 215/48,
241/46, 453/02, A61P 25/28, A61K 31/47, 31/517

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/12375

(22) Internationales Anmeldedatum:
6. November 2002 (06.11.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
101 56 719.7 19. November 2001 (19.11.2001) DE

CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,
SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die
folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU,
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HENDRIX, Martin
[DE/DE]; Im Geroden 5, 51519 Odenthal (DE). BÖSS,
Frank-Gerhard [DE/DE]; Auf dem Scheidt 29f, 42115
Wuppertal (DE). ERB, Christina [DE/DE]; Emmastr. 22,
40227 Düsseldorf (DE). KRÜGER, Joachim [DE/DE];
Golzheimer Platz 4, 40474 Düsseldorf (DE). LUTHLE,
Joachim [DE/DE]; Kastanienallee 29a, 42489 Wülfrath
(DE). METHFESSEL, Christoph [DE/DE]; Kirchhof-
str. 94, 42327 Wuppertal (DE). SCHREIBER, Rudy
[DE/US]; 1074 Marcussen Drive, Menlo Park, CA 94025
(US). WIESE, Welf-Burkhard [DE/DE]; Tiergartenstr.
2, 51145 Köln (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGE-
SELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

(54) Title: HETEROARYL CARBOXYLIC ACID AMIDES

(54) Bezeichnung: HETEROARYLCARBONSÄUREAMIDE

(57) Abstract: The invention relates to novel heteroaryl carboxylic acid amides, a method for producing the same and the use thereof
for producing pharmaceuticals for the treatment and/or prophylaxis of diseases and for improving perception, power of concentration,
learning ability and/or memory power.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft neue Heteroarylcarbonsäureamide, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Ver-
wendung zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten und zur Verbesserung der Wahr-
nehmung, Konzentrationsleistung, Lernleistung und/oder Gedächtnisleistung.

WO 03/043991 A1

Heteroarylcarbonsäureamide

Die Erfindung betrifft neue Heteroarylcarbonsäureamide, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung
5 und/oder Prophylaxe von Krankheiten und zur Verbesserung der Wahrnehmung, Konzentrationsleistung, Lernleistung und/oder Gedächtnisleistung.

Nikotinische Acetylcholin-Rezeptoren (nAChR) bilden eine große Familie von Ionenkanälen, die durch den körpereigenen Botenstoff Acetylcholin aktiviert werden
10 (Galzi and Changeux, *Neuropharmacol.* 1995, 34, 563-582). Ein funktioneller nAChR besteht aus fünf Untereinheiten, die unterschiedlich (bestimmte Kombinationen von α 1-9 und β 1-4, γ , δ , ϵ -Untereinheiten) oder identisch (α 7-9) sein können. Dies führt zur Bildung einer Vielfalt von Subtypen, die eine unterschiedliche
15 Verteilung in der Muskulatur, dem Nervensystem und anderen Organen zeigen (McGehee and Role, *Annu. Rev. Physiol.*, 1995, 57, 521-546). Aktivierung von nAChR führt zum Einstrom von Kationen in die Zelle und zur Stimulation von Nerven- oder Muskelzellen. Selektive Aktivierung einzelner nAChR-Subtypen beschränkt diese Stimulation auf die Zelltypen, die den entsprechenden Subtyp
20 besitzen und kann so unerwünschte Nebeneffekte wie z.B. die Stimulierung von nAChR in der Muskulatur vermeiden. Klinische Experimente mit Nikotin und Experimente in verschiedenen Tiermodellen weisen auf eine Rolle von zentralen nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren bei Lern- und Gedächtnisvorgängen hin (z.B. Rezvani and Levin, *Biol. Psychiatry* 2001, 49, 258-267). Nikotinische Acetyl-
25 cholinrezeptoren des α 7-Subtyps (α 7-nAChR) haben eine besonders hohe Konzentration in für Lernen und Gedächtnis wichtigen Hirnregionen, wie dem Hippocampus und dem cerebralen Cortex (Séguéla et al., *J. Neurosci.* 1993, 13, 596-604). Der α 7-nAChR besitzt eine besonders hohe Durchlässigkeit für Calcium-Ionen, erhöht glutamaterge Neurotransmission, beeinflusst das Wachstum von
30 Neuriten und moduliert auf diese Weise die neuronale Plastizität (Broide and Leslie, *Mol. Neurobiol.* 1999, 20, 1-16).

Die WO 85/01048 und die DE-A-3724059 beschreiben bestimmte Hetero-
arylcarbonsäureamide als Serotonin-M- bzw. 5HT₃-Antagonisten zur Behandlung
von Arrhythmien und Schmerz bzw. Psychosen und Störungen des Wachheits-
zustandes.


Die EP-A-0 327 335 offenbart bestimmte Heteroarylcarbonsäureamide mit
gedächtnisverbessernder Wirkung.

10 Isochinolincarbonsäureamide mit 5HT₃-antagonistischer Wirkung zur Behandlung
von ZNS-Erkrankungen sind aus der WO 91/17161 bekannt.

Die WO 01/60821 offenbart Biarylcarbonsäureamide mit Affinität zum $\alpha 7$ -nAChR
zur Behandlung von Lern- und Wahrnehmungsstörungen.

15 Bestimmte 2- und 3-Chinolincarbonsäureamide werden in Orjales et al. *Drug Des.*
Discovery 2000, 16, 271-279 als Liganden am 5HT₃-Rezeptor beschrieben.

Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungen der allgemeinen Formel (I),
20



in welcher

R^1 für einen Aza-bicyclo[m.n.o]alkyl-Rest mit 7 bis 11 Ringatomen steht,
25 worin m, n und o gleich oder verschieden sind und 0, 1, 2 oder 3 bedeuten,
und wobei der Rest gegebenenfalls durch (C₁-C₆)-Alkyl substituiert ist,

der Ring A für Pyrimido steht, oder

für gegebenenfalls Benzo-kondensiertes Pyrido, Pyridazo oder Pyridazino steht,

5 und

R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Reste ausgewählt aus der Gruppe Wasserstoff, Halogen, Formyl, Carbamoyl, Cyano, Trifluormethyl, Trifluor-
methoxy, Nitro, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₁-C₆)-Alkylthio, (C₃-C₈)-
10 Cycloalkyl, 4- bis 8-gliedriges Heterocyclyl, Phenyl oder 5- bis 6-gliedriges
Heteroraryl stehen, wobei Phenyl und Heteroaryl gegebenenfalls durch
Halogen, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, Amino, Mono- oder Di-(C₁-C₄)-
Alkylamino, (C₁-C₄)-Alkanoylamino oder (C₁-C₄)-Alkansulfonylamino sub-
stituiert sind.

15

In der allgemeinen Formel (I) können die Reste R^2 und R^3 unabhängig voneinander
an den Ring A oder an den Benzolring gebunden sein. Vorzugsweise sind die Reste
 R^2 und R^3 an den Ring A gebunden.

20 Die erfindungsgemäßen Verbindungen können in stereoisomeren Formen, die sich ent-
weder wie Bild und Spiegelbild (Enantiomere), oder die sich nicht wie Bild und
Spiegelbild (Diastereomere) verhalten, existieren. Die Erfindung betrifft sowohl die
Enantiomeren oder Diastereomeren oder deren jeweiligen Mischungen. Diese
Mischungen der Enantiomere und Diastereomere lassen sich in bekannter Weise in die
25 stereoisomer einheitlichen Bestandteile trennen.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können auch in Form ihrer Salze, Hydrate
und/oder Solvate vorliegen.

30 Als Salze sind im Rahmen der Erfindung physiologisch unbedenkliche Salze der erfin-
dungsgemäßen Verbindungen bevorzugt.

Physiologisch unbedenkliche Salze der erfindungsgemäßen Verbindungen können Säureadditionssalze der Verbindungen mit Mineralsäuren, Carbonsäuren oder Sulfonsäuren sein. Besonders bevorzugt sind z.B. Salze mit Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Methansulfonsäure, Ethansulfonsäure, Toluolsulfonsäure, Benzolsulfonsäure, Naphthalindisulfonsäure, Essigsäure, Propionsäure, Milchsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Fumarsäure, Maleinsäure oder Benzoesäure.

Als Salze können aber auch Salze mit üblichen Basen genannt werden, wie beispielsweise Alkalimetallsalze (z.B. Natrium- oder Kaliumsalze), Erdalkalisalze (z.B. Calcium- oder Magnesiumsalze) oder Ammoniumsalze, abgeleitet von Ammoniak oder organischen Aminen wie beispielsweise Diethylamin, Triethylamin, Ethyldiisopropylamin, Prokain, Dibenzylamin, N-Methylmorpholin, Dihydroabiethylamin, 1-Ephenamin oder Methyl-piperidin.

Hydrate der erfindungsgemäßen Verbindungen sind stöchiometrische Zusammensetzungen der Verbindungen oder seinen Salzen mit Wasser.

Solvate der erfindungsgemäßen Verbindungen sind stöchiometrische Zusammensetzungen der Verbindungen oder seinen Salzen mit Lösungsmittel.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung haben die Substituenten im Allgemeinen die folgende Bedeutung:

(C₁-C₄)-Alkanoylamino steht für einen geradkettigen oder verzweigten Alkanoylaminorest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkanoylaminorest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Formylamino, Acetylamino, Propanoylamino, n-Butanoylamino, i-Butanoylamino.

(C₁-C₆)- und (C₁-C₄)-Alkoxy steht für einen geradkettigen oder verzweigten Alkoxyrest mit 1 bis 6 bzw. 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkoxyrest mit 1 bis 4, besonders bevorzugt mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, tert.Butoxy, n-Pentoxy und n-Hexoxy.

(C₁-C₆)- und (C₁-C₄)-Alkyl stehen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 6 bzw. 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkylrest mit 1 bis 4, besonders bevorzugt mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, tert.Butyl, n-Pentyl und n-Hexyl.

Mono-(C₁-C₄)-Alkylamino steht für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylaminorest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkylaminorest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Methylamino, Ethylamino, n-Propylamino, Isopropylamino, tert.Butylamino.

Di-(C₁-C₄)-alkylamino steht für einen geradkettigen oder verzweigten Dialkylaminorest, wobei die Alkylreste gleich oder verschieden sein können und jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatome enthalten. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Dialkylaminorest, wobei der Alkylrest jeweils 1 bis 3 Kohlenstoffatome enthält. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Dimethylamino, Diethylamino, Di-n-propylamino, Diisopropylamino, Di-t-butylamino, Di-n-pentylamino, Di-n-hexylamino, Ethylmethylamino, Isopropylmethylamino, n-Butylethylamino.

(C₁-C₄)-Alkansulfonylamino stehen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkansulfonylaminorest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkansulfonylaminorest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Methansulfonylamino, Ethansulfonylamino, n-Propansulfonylamino, Isopropansulfonylamino, tert.Butansulfonylamino.

(C₁-C₆)-Alkylthio steht für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylthio-
rest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkylthio-
rest mit 1 bis 4, besonders bevorzugt mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise
5 und vorzugsweise seien genannt: Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, Isopropylthio,
tert. Butylthio, n-Pentylthio und n-Hexylthio.

Der Aza-bicyclo[m.n.o]alkyl-Rest mit 7 bis 11 Ringatomen ist vorzugsweise über ein
Kohlenstoff-Ringatom an das benachbarte Amidstickstoffatom gebunden. Vorzugs-
10 weise sitzen das Stickstoff-Ringatom und das Amidstickstoffatom nicht am selben
Kohlenstoff-Ringatom. Besonders bevorzugt sind Aza-bicyclo[m.n.o]alkyl-Reste, bei
denen das Stickstoff-Ringatom und das Amidstickstoffatom durch zwei Kohlenstoff-
Ringatome getrennt sind. Als Beispiele für Aza-bicyclo[m.n.o]alkyl-Reste seien
genannt: 8-Aza-bicyclo[3.2.1]octyl (Tropan), 1-Aza-bicyclo[3.2.1]octyl (Isotropan),
15 8-Aza-bicyclo[3.3.1]nonyl (Granatan), 1-Aza-bicyclo[3.3.1]nonyl (Isogranatan), 1-
Aza-bicyclo[2.2.2]octyl (Chinuclidin), 2-Aza-bicyclo[2.2.2]octyl (Isochinuclidin).

(C₃-C₈)-Cycloalkyl steht für Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclobutyl, Cyclohexyl,
Cycloheptyl oder Cyclooctyl. Bevorzugt seien genannt: Cyclopropyl, Cyclopentyl und
20 Cyclohexyl.

Halogen steht für Fluor, Chlor, Brom und Jod. Bevorzugt sind Fluor, Chlor und
Brom. Besonders bevorzugt sind Fluor und Chlor.

25 5- bis 6-gliedriges Heteroaryl steht für einen aromatischen Rest mit 5 bis 6 Ring-
atomen und bis zu 4 Heteroatomen aus der Reihe S, O und/oder N. Der Heteroarylrest
kann über ein Kohlenstoff- oder Heteroatom gebunden sein. Beispielsweise und
vorzugsweise seien genannt: Thienyl, Furyl, Pyrrolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Imidazolyl,
Tetrazolyl, Pyridyl, Pyrimidinyl, und Pyridazinyl.

4- bis 8-gliedriges Heterocyclyl steht für einen mono- oder polycyclischen, heterocyclischen Rest mit 4 bis 8 Ringatomen und bis zu 3, vorzugsweise 1 Heteroatomen bzw. Heterogruppen aus der Reihe N, O, S, SO, SO₂. Mono- oder bicyclisches Heterocyclyl ist bevorzugt. Besonders bevorzugt ist monocyclisches Carbocyclyl. Als Heteroatome sind N und O bevorzugt. Die Heterocyclyl-Reste können gesättigt oder teilweise ungesättigt sein. Gesättigte Heterocyclyl-Reste sind bevorzugt. Die Heterocyclyl-Reste können über ein Kohlenstoffatom oder ein Heteroatom gebunden sein. Besonders bevorzugt sind 5- bis 7-gliedrige, monocyclische gesättigte Heterocyclylreste mit bis zu zwei Heteroatomen aus der Reihe O, N und S. Beispielsweise und vorzugsweise seien genannt: Oxetan-3-yl, Pyrrolidin-2-yl, Pyrrolidin-3-yl, Pyrrolinyl, Tetrahydrofuranyl, Tetrahydrothienyl, Pyranyl, Piperidinyl, Thiopyranyl, Morpholinyl, Perhydroazepinyl.

Wenn Reste in den erfindungsgemäßen Verbindungen gegebenenfalls substituiert sind, können die Reste, soweit nicht anders spezifiziert, ein- oder mehrfach gleich oder verschieden substituiert sein. Eine Substitution mit bis zu drei gleichen oder verschiedenen Substituenten ist bevorzugt.

Bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),
in welcher

R¹ für einen Aza-bicyclo[m.n.o]alkyl-Rest mit 7 bis 9 Ringatomen steht,
worin m, n und o gleich oder verschieden sind und 0, 1, 2 oder 3 bedeuten,
und wobei der Rest gegebenenfalls durch Methyl oder Ethyl substituiert ist,

und der Ring A, R² und R³ die oben angegebene Bedeutung haben.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),
in welcher

R¹ für 1-Aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl steht,

und der Ring A, R² und R³ die oben angegebene Bedeutung haben.

5

Ebenfalls bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),

in welcher

10

der Ring A für Pyrido steht,

und R¹, R² und R³ die oben angegebene Bedeutung haben.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),

15

in welcher

der Ring A zusammen mit dem ankondensierten Benzolrest für Chinolin-6-yl steht,

und R¹, R² und R³ die oben angegebene Bedeutung haben.

20

Ebenfalls bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),

in welcher

25

R² und R³ gleich oder verschieden sind und für Reste ausgewählt aus der Gruppe
Wasserstoff, Halogen, Cyano, Trifluormethyl, Methyl und Ethyl stehen,

und der Ring A und R¹ die oben angegebene Bedeutung haben.

30

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),

in welcher

R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Reste ausgewählt aus der Gruppe
Wasserstoff, Halogen, und Methyl stehen,

5

und der Ring A und R^1 die oben angegebene Bedeutung haben.

Ganz besonders bevorzugt sind Kombinationen von zwei oder mehreren der oben
genannten Vorzugsbereiche.

10

Ebenfalls ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I),

in welcher

15

R^1 für 1-Aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl steht,

der Ring A zusammen mit dem ankondensierten Benzolrest für Chinolin-5-yl oder
Chinolin-6-yl steht, und


20

R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Reste ausgewählt aus der Gruppe
Wasserstoff, Fluoro, Chloro, und Methyl stehen.

Die Erfindung betrifft weiterhin Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der
Formel (I), dadurch gekennzeichnet, dass man

25


Verbindungen der allgemeinen Formel (II),



30

in welcher R^1 die oben genannte Bedeutung hat,

mit einer Verbindung der allgemeinen Formel (III),



in welcher

5

der Ring A, R² und R³ die oben genannte Bedeutung haben, und

X für Hydroxy oder eine geeignete Abgangsgruppe steht,

10

in einem inerten Lösungsmittel gegebenenfalls in Gegenwart eines Kondensationsmittels und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base umgesetzt.

Wenn X eine Abgangsgruppe ist, sind Chloro, Mesyloxy und Isobutyloxycarbonyloxy, besonders Chloro bevorzugt.

15

Inerte Lösungsmittel sind beispielsweise Halogenkohlenwasserstoffe wie Methylenechlorid, Trichlormethan, Tetrachlormethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan, 1,2-Dichlorethan oder Trichlorethylen, Ether wie Diethylether, Methyl-tert.-butylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, Glykoldimethylether oder Diethylenglykoldimethylether, Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Xylol, Toluol, Hexan, Cyclohexan oder Erdölfraktionen, oder andere Lösungsmittel wie Nitromethan, Ethylacetat, Aceton, Dimethylformamid, Dimethylacetamid, 1,2-Dimethoxyethan, Dimethylsulfoxid, Acetonitril oder Pyridin, bevorzugt sind Tetrahydrofuran, Dimethylformamid oder Chloroform.

20

25

Kondensationsmittel sind beispielsweise Carbodiimide wie z.B. N,N'-Diethyl-, N,N'-Dipropyl-, N,N'-Diisopropyl-, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, N-(3-Dimethylaminoisopropyl)-N'-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid (EDC), N-Cyclohexylcarbodiimid-N'-

propyloxymethyl-Polystyrol (PS-Carbodiimid) oder Carbonylverbindungen wie Carbonyldiimidazol, oder 1,2-Oxazoliumverbindungen wie 2-Ethyl-5-phenyl-1,2-oxazolium-3-sulfat oder 2-tert.-Butyl-5-methyl-isoxazolium-perchlorat, oder Acylaminoverbindungen wie 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin, oder

5 Propanphosphonsäureanhydrid, oder Isobutylchloroformat, oder Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphorylchlorid oder Benzotriazolyl-oxy-tri(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat, oder O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetra-methyluronium-hexafluorophosphat (HBTU), 2-(2-Oxo-1-(2H)-pyridyl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat (TPTU) oder O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetra-

10 methyl-uroniumhexafluorophosphat (HATU) oder Benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)-phosphoniumhexafluorophosphat (BOP), oder Mischungen aus diesen.

Gegebenenfalls kann es vorteilhaft sein, diese Kondensationsmittel in Gegenwart

15 eines Hilfsnucleophils wie z.B. 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) zu verwenden.

Basen sind beispielsweise Alkalicarbonate, wie z.B. Natrium- oder Kaliumcarbonat, oder -hydrogencarbonat, oder organische Basen wie Trialkylamine z.B. Triethylamin, N-Methylmorpholin, N-Methylpiperidin, 4-Dimethylaminopyridin oder Diisopropylethylamin.

20

Besonders bevorzugt ist die Kombination von N-(3-Dimethylaminoisopropyl)-N'-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid (EDC) und 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) in Dimethylformamid.

25


Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Verfahren in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 50°C bei Normaldruck durchgeführt.

Die Verbindungen der allgemeinen Formeln (II) und (III) sind bekannt oder lassen sich nach bekannten Verfahren aus den entsprechenden Edukten synthetisieren (vgl.

30

z.B. „Comprehensive Heterocyclic Chemistry“, Katritzki et al., Hrsg.; Elsevier, 1996).

5 So können beispielsweise Chinolincarbonsäuren [X^1 steht für Hydroxy und der Ring A für [b]Pyrido in Verbindungen der allgemeinen Formel (III)], durch Oxidation der entsprechenden Methylchinoline (Miller et al. *Chem. Ber.* 1890, 23, 2263 ff.) oder der entsprechenden Aldehyde (Howitz et al. *Justus Liebigs Ann. Chem.* 1913, 396, 37) mit geeigneten Oxidationsmitteln wie z.B. Cr_2O_3 erhalten werden.




10

Weiterhin kann man beispielsweise 6-Chinolincarbonsäuren durch Umsetzung von 4-Aminobenzoessäure mit geeigneten Enonen erhalten (John et al. *J. Prakt. Chem.* 1925, 111, 95), wie durch das folgende Syntheschema beispielhaft verdeutlicht wird.

15

Syntheschema 1:




Alternativ können erfindungsgemäße Chinolincarbonsäureamide hergestellt werden, indem man die entsprechenden Iod- und Aminosubstituierten Benzoessäureamide in der Gegenwart von geeigneten Katalysatoren mit Allyl- und Propargylalkoholen

20

umsetzt (vgl. Kuo et al. *Tetrahedron Lett.* 1991, 32, 569), wie durch das folgende Syntheschema beispielhaft verdeutlicht wird.

Syntheschema 2:



5

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eignen sich zur Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten bei Menschen und/oder Tieren.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen zeigen ein nicht vorhersehbares, wertvolles pharmakologisches Wirkspektrum.

10 Sie zeichnen sich als Liganden, insbesondere Agonisten am $\alpha 7$ -nAChR aus.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können aufgrund ihrer pharmakologischen Eigenschaften allein oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung und/oder Prävention von kognitiven Störungen, insbesondere der Alzheimerschen

Krankheit eingesetzt werden. Wegen ihrer selektiven Wirkung als $\alpha 7$ -nAChR Agonisten eignen sich die erfindungsgemäßen Verbindungen besonders zur Verbesserung der Wahrnehmung, Konzentrationsleistung, Lernleistung, oder Gedächtnisleistung insbesondere nach kognitiven Störungen, wie sie beispielsweise bei Situationen/Krankheiten/Syndromen auftreten wie „Mild cognitive impairment“, Altersassoziierte Lern- und Gedächtnisstörungen, Altersassoziierte Gedächtnisverluste, Vaskuläre Demenz, Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall, Demenz, die nach Schlaganfällen auftritt („post stroke dementia“), post-traumatisches Schädel Hirn Trauma, allgemeine Konzentrationsstörungen, Konzentrationsstörungen in Kindern mit Lern- und Gedächtnisproblemen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Alzheimersche Krankheit, Vaskuläre Demenz, Demenz mit Lewy-Körperchen, Demenz mit Degeneration der Frontallappen einschließlich des Pick's Syndroms, Parkinsonsche Krankheit, Progressive nuclear palsy, Demenz mit corticobasaler Degeneration, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Huntingtonsche Krankheit, Multiple Sklerose, Thalamische Degeneration, Creutzfeld-Jacob-Demenz, HIV-Demenz, Schizophrenie, Schizophrenie mit Demenz oder Korsakoff-Psychose.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können allein oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln eingesetzt werden zur Prophylaxe und Behandlung von akuten und/oder chronischen Schmerzen (für eine Klassifizierung siehe "Classification of Chronic Pain, Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms", 2. Aufl., Meskey und Begduk, Hrsg.; IASP-Press, Seattle, 1994), insbesondere zur Behandlung von Krebs-induzierten Schmerzen und chronischen neuropathischen Schmerzen, wie zum Beispiel, bei diabetischer Neuropathie, postherpetischer Neuralgie, peripheren Nervenbeschädigungen, zentralem Schmerz (beispielsweise als Folge von cerebraler Ischämie) und trigeminaler Neuralgie, und anderen chronischen Schmerzen, wie zum Beispiel Lumbago, Rückenschmerz (low back pain) oder rheumatischen Schmerzen. Daneben eignen sich diese Substanzen auch zur Therapie von primär akuten Schmerzen jeglicher Genese und von daraus resultierenden sekundären Schmerzzuständen, sowie zur Therapie chronifizierter, ehemals akuter Schmerzzustände.

Die *in vitro*-Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen kann in folgenden Assays gezeigt werden:

1. Bestimmung der Affinität von Testsubstanzen für $\alpha 7$ -nAChR durch
5 Inhibition von [3 H]Methyllycaconitine-Bindung an Rattenhirnmembranen

Der [3 H]-Methyllycaconitine Bindungstest ist eine Modifikation der von Davies et al. (*Neuropharmacol.* 1999, 38, 679-690) beschriebenen Methode.

10 Rattenhirngewebe (Hippocampus oder Gesamthirn) wird in Homogenisierungspuffer (10 % w/v) (0.32 M Sucrose, 1 mM EDTA, 0.1 mM Phenylmethylsulfonyl fluorid (PMSF), 0.01 % (w/v) NaN₃, pH 7.4, 4 °C) bei 600 rpm in einem Glashomogenisator homogenisiert. Das Homogenat wird zentrifugiert (1000 x g, 4°C, 10 min) und der
15 Überstand wird abgenommen. Das Pellet wird erneut suspendiert (20 % w/v) und zentrifugiert (1000 x g, 4°C, 10 min). Die beiden Überstände werden vereinigt und zentrifugiert (15.000 x g, 4°C, 30 min). Dieses Pellet wird als P2 Fraktion bezeichnet.

Das P2-Pellet wird zweimal mit Bindungspuffer gewaschen (50 mM Tris-HCl, 1 mM
20 MgCl₂, 120 mM NaCl, 5 mM KCl, 2 mM CaCl₂, pH 7.4) und zentrifugiert (15.000 x g, 4°C, 30 min).

Die P2 Membranen werden in Bindungspuffer resuspendiert und in einem Volumen von 250 µl (Membranproteinmenge 0.1 - 0.5 mg) für 2.5 h bei 21°C inkubiert in der
25 Gegenwart von 1-5 nM [3 H]-Methyllycaconitine, 0.1 % (w/v) BSA (bovines Serumalbumin) und verschiedenen Konzentrationen der Testsubstanz. Die unspezifische Bindung wird bestimmt durch Inkubation in der Gegenwart von 1 µM α -Bungarotoxin oder 100 µM nicotine oder 10 µM MLA (Methyllycaconitine).

30 Die Inkubation wird beendet durch Zugabe von 4 ml PBS (20 mM Na₂HPO₄, 5 mM KH₂PO₄, 150 mM NaCl, pH 7.4, 4°C) und Filtration durch Typ A/E glass fibre filters

- (Gelman Sciences), die vorher 3 h in 0.3 % (v/v) Polyethyleneimine (PEI) eingelegt waren. Die Filter werden zweimal mit 4 ml PBS (4°C) gewaschen und die gebundene Radioaktivität durch Szintillationsmessung bestimmt. Alle Tests werden in Dreifachbestimmungen durchgeführt. Aus dem IC_{50} -Wert der Verbindungen (Konzentration der Testsubstanz, bei der 50% des am Rezeptor gebundenen Liganden verdrängt werden), der Dissoziationskonstante K_D und der Konzentration L von [3H]Methyllycaconitine wurde die Dissoziationskonstante der Testsubstanz K_i bestimmt ($K_i = IC_{50} / (1 + L/K_D)$).
- 10 Anstelle von [3H]-Methyllycaconitine können auch andere $\alpha 7$ -nAChR-selektive Radioliganden wie z.B. [^{125}I]- α -Bungarotoxin oder unselektive nAChR-Radioliganden gemeinsam mit Inhibitoren anderer nAChR eingesetzt werden.
- Die Eignung der erfindungsgemäßen Verbindungen zur Behandlung von kognitiven
- 15 Störungen kann in folgenden Tiermodellen gezeigt werden:

2. Objekt-Wiedererkennungstest

Der Objekt-Wiedererkennungstest ist ein Gedächtnistest. Er misst die Fähigkeit von Ratten (und Mäusen), zwischen bekannten und unbekannten Objekten zu unterscheiden.

Der Test wird wie beschrieben durchgeführt (Blokland et al. *NeuroReport* 1998, 9, 4205-4208; Ennaceur, A., Delacour, J., *Behav. Brain Res.* 1988, 31, 47-59; Ennaceur, A., Meliani, K., *Psychopharmacology* 1992, 109, 321-330; Prickaerts, et al. *Eur. J. Pharmacol.* 1997, 337, 125-136).

In einem ersten Durchgang wird eine Ratte in einer ansonsten leeren größeren Beobachtungsarena mit zwei identischen Objekten konfrontiert. Die Ratte wird beide Objekte ausgiebig untersuchen, d.h. beschnüffeln und berühren. In einem zweiten Durchgang, nach einer Wartezeit von 24 Stunden, wird die Ratte erneut in die Beobachtungsarena gesetzt. Nun ist eines der bekannten Objekte durch ein neues, unbekanntes Objekt ersetzt. Wenn eine Ratte das bekannte Objekt wiedererkennt, wird sie vor allem das unbekannte Objekt untersuchen. Nach 24 Stunden hat eine Ratte jedoch normalerweise vergessen, welches Objekt sie bereits im ersten Durchgang untersucht hat, und wird daher beide Objekte gleichstark inspizieren. Die Gabe einer Substanz mit lern- und gedächtnisverbessernder Wirkung wird dazu führen, dass eine Ratte das bereits 24 Stunden vorher, im ersten Durchgang, gesehene Objekt als bekannt wiedererkennt. Sie wird das neue, unbekannte Objekt ausführlicher untersuchen als das bereits bekannte. Diese Gedächtnisleistung wird in einem Diskriminationsindex ausgedrückt. Ein Diskriminationsindex von Null bedeutet, dass die Ratte beide Objekte, das alte und das neue, gleichlang untersucht; d.h. sie hat das alte Objekt nicht wiedererkannt und reagiert auf beide Objekte als wären sie unbekannt und neu. Ein Diskriminationsindex größer Null bedeutet, dass die Ratte das neue Objekt länger inspiziert als das alte; d.h. die Ratte hat das alte Objekt wiedererkannt.

3. Sozialer Wiedererkennungstest:

Der Soziale Wiedererkennungstest ist ein Test zur Prüfung der lern- oder gedächtnisverbessernden Wirkung von Testsubstanzen.

5

Erwachsene Ratten, die in Gruppen gehalten werden, werden 30 Minuten vor Testbeginn einzeln in Testkäfige gesetzt. Vier Minuten vor Testbeginn wird das Testtier in eine Beobachtungsbox gebracht. Nach dieser Adaptationszeit wird ein juveniles Tier zu dem Testtier gesetzt und 2 Minuten lang die totale Zeit gemessen, die das adulte Tier das Junge untersucht (Trial 1). Gemessen werden alle deutlich auf das Jungtier gerichteten Verhaltensweisen, d.h. ano-genitale Inspektion, Verfolgen sowie Fellpflege, bei denen das Alttier einen Abstand von höchstens 1 cm zu dem Jungtier hat. Danach wird das Juvenile herausgenommen und das Adulte in seinem Testkäfig belassen (bei 24 Stunden Retention wird das Tier in seinen Heimkäfig zurückgesetzt). Vor oder nach dem ersten Test wird das Versuchstier mit Substanz behandelt. Je nach Zeitpunkt der Substanzgabe wird das Erlernen oder das Speichern der Information über das Jungtier durch die Substanz beeinflusst. Nach einem festgelegten Zeitraum (Retention) wird der Test wiederholt (Trial 2). Je größer die Differenz zwischen den in Trial 1 und 2 ermittelten Investigationszeiten, desto besser hat sich das adulte Tier an das Jungtier erinnert

10

15

20

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eignen sich zur Verwendung als Arzneimittel für Menschen und Tiere.

25

Zur vorliegenden Erfindung gehören auch pharmazeutische Zubereitungen, die neben inerten, nicht-toxischen, pharmazeutisch geeigneten Hilfs- und Trägerstoffen eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (I) enthalten, oder die aus einem oder mehreren Verbindungen der Formel (I) bestehen, sowie Verfahren zur Herstellung dieser Zubereitungen.

30

Die Verbindungen der Formel (I) sollen in diesen Zubereitungen in einer Konzentration von 0,1 bis 99,5 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 95 Gew.-% der Gesamtmischung vorhanden sein.

- 5 Neben den Verbindungen der Formel (I) können die pharmazeutischen Zubereitungen auch andere pharmazeutische Wirkstoffe enthalten.

Die oben aufgeführten pharmazeutischen Zubereitungen können in üblicher Weise nach bekannten Methoden hergestellt werden, beispielsweise mit dem oder den Hilfs-
10 oder Trägerstoffen.

Die neuen Wirkstoffe können in bekannter Weise in die üblichen Formulierungen überführt werden, wie Tabletten, Dragees, Pillen, Granulate, Aerosole, Sirupe, Emulsionen, Suspensionen und Lösungen, unter Verwendung inerter, nicht toxischer,
15 pharmazeutisch geeigneter Trägerstoffe oder Lösungsmittel. Hierbei soll die therapeutisch wirksame Verbindung jeweils in einer Konzentration von etwa 0,5 bis 90 Gew.-% der Gesamtmischung vorhanden sein, d.h. in Mengen, die ausreichend sind, um den angegebenen Dosierungsspielraum zu erreichen.

20 Die Formulierungen werden beispielsweise hergestellt durch Verstrecken der Wirkstoffe mit Lösungsmitteln und/oder Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln, wobei z.B. im Fall der Benutzung von Wasser als Verdünnungsmittel gegebenenfalls organische Lösungsmittel als Hilfs-
lösungsmittel verwendet werden können.

25

Die Applikation erfolgt in üblicher Weise, vorzugsweise oral, transdermal oder parenteral, insbesondere perlingual oder intravenös. Sie kann aber auch durch Inhalation über Mund oder Nase, beispielsweise mit Hilfe eines Sprays erfolgen, oder topisch über die Haut.

30

Im Allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, Mengen von etwa 0,001 bis 10 mg/kg, bei oraler Anwendung vorzugsweise etwa 0,005 bis 3 mg/kg Körpergewicht zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen.

- 5 Trotzdem kann es gegebenenfalls erforderlich sein, von den genannten Mengen abzuweichen, und zwar in Abhängigkeit vom Körpergewicht bzw. der Art des Applikationsweges, vom individuellen Verhalten gegenüber dem Medikament, der Art von dessen Formulierung und dem Zeitpunkt bzw. Intervall, zu welchen die Verabreichung erfolgt. So kann es in einigen Fällen ausreichend sein, mit weniger als der vorgenannten
- 10 Mindestmenge auszukommen, während in anderen Fällen die genannte obere Grenze überschritten werden muss. Im Falle der Applikation größerer Mengen kann es empfehlenswert sein, diese in mehreren Einzelgaben über den Tag zu verteilen.


Abkürzungen:

15

DMF	<i>N,N</i> -Dimethylformamid
DMSO	Dimethylsulfoxid
HOBt	1-Hydroxy-1H-benzotriazol x H ₂ O
NMR	Kernresonanzspektroskopie
RT	Raumtemperatur
TBTU	<i>O</i> -(Benzotriazol-1-yl)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethyluronium-Tetrafluoroborat
THF	Tetrahydrofuran

AusgangsverbindungenBeispiel 1A

5 4-Amino-3-Iodbenzoesäure




10 Eine Lösung von 3,00 g (10,8 mmol) 4-Amino-3-Iodbenzoesäuremethylester und 1,30 g (54,1 mmol) Lithiumhydroxid in 150 ml eines Gemisches von Dioxan/Wasser (1:1) wurde 6 h bei Raumtemperatur geführt. Das Dioxan wurde im Vakuum abdestilliert und die verbleibende wässrige Phase wurde mit 1 M Salzsäure auf pH 5 gestellt. Der Niederschlag wurde abgesaugt und mit Wasser gewaschen. Man erhielt 2,80 g (98 %) der Titelverbindung als Feststoff.

15 HPLC (Kromasil RP-18, 60x2,1 mm, Eluent = A: H₂O + 5 mL HClO₄/L; B: Acetonitril; Gradient = 0 – 4.5 min 98 % A – 90 % B; 4.5 – 6.5 min 90 % B; 0.75 mL/min; Temp.: 30°C, UV-Detektion bei 210 nm): Rt = 3.51 min
¹H-NMR (300 MHz in D₆-DMSO) δ = 5,98 (s, 2H), 6,74 (d, 1H), 7,63 (m, 1H), 8,10 (s, 1H), 12,33 (s, breit, 1H)

20 MS (ESI+): m/z = 281 [M+NH₄]⁺

Beispiel 2A

4-Amino-N-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-3-iodbenzamid



Eine Lösung von 2,04 g (10,3 mmol) 3-Aminoquinuclidindihydrochlorid, 2,70 g (10,3 mmol) 4-Amino-3-Iodbenzoesäure, 1,39 g (10,3 mmol) HOBt, 2,16 g (11,3 mmol) EDC und 6,63 g (51,3 mmol) N,N-Diisopropylethylamin in 150 ml DMF wurde für 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Es wurde mit 300 ml Wasser versetzt und die wässrige Phase wurde dreimal mit je 300 ml Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel wurde im Vakuum abdestilliert. Der Rückstand wurde über eine Flash-Säule gereinigt (Laufmittel: Dichlormethan / Methanol / Triethylamin 90:10:0,2). Man erhielt 3,45 g (87 %) der gewünschten Titelverbindung.

10

HPLC (Bedingungen wie bei Beispiel 1A): $R_t = 3,29$ min


$^1\text{H-NMR}$ (200 MHz in $\text{D}_6\text{-DMSO}$) $\delta = 1,18\text{-}1,87$ (m, 5H), 2,58-3,13 (m, 6H), 3,49 (m, breit, 1H), 3,89 (m, 1H), 5,75 (m, 3H), 6,72 (d, 1H), 7,63 (dd, 1H), 7,92 (d, 1H), 8,12 (d, 1H)

15

MS (ESI⁺): $m/z = 372$ $[\text{M}+\text{H}]^+$

Beispiel 3A

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-4-iod-3-nitrobenzamid



20

Eine Lösung von 3,08 g (24,4 mmol) 3-Aminoquinuclidindihydrochlorid, 7,60 g (24,4 mmol) 4-Iod-3-nitrobenzoylchlorid, 9,88 g (97,6 mmol) Triethylamin in 150 ml DMF wurde über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wurde am Rotationsverdampfer abdestilliert, es wurde in 200 ml Dichlormethan aufgenommen und mit 200 ml einer ges. Natriumhydrogencarbonat-Lsg. versetzt. Die organische Phase wurde über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel wurde im Vakuum abdestilliert. Man erhielt 2,20 g (22,5 %) der gewünschten Titelverbindung.

25


HPLC (Bedingungen wie bei Beispiel 1A): $R_t = 3.72$ min.

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz in CDCl_3) $\delta = 1.24\text{--}1.78$ (m, 5H), 2.05 (m, 1H), 2.61 (m, 1H), 2.89 (m, 3H), 3.46 (m, 1H), 4.15 (m, 1H), 6.24 (m, 1H), 7.67 (dd, 1H), 8.14 (d, 1H), 8.20 (d, 1H).

MS (ESI⁺): $m/z = 402$ $[\text{M}+\text{H}]^+$

Beispiel 4A

10 3-Amino-N-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-4-iodbenzamid



Eine Lösung von 100 mg (0,25 mmol) N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-4-iod-3-nitrobenzamid und 281mg (1,25 mmol) Zinn(II)chloriddihydrat in 5 ml DMF wurde 6 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wurde am Rotationsverdampfer abdestilliert, der Rückstand wurde in 10 ml Dichlormethan aufgenommen und mit 10 ml einer wässrigen 1 M Natronlauge versetzt. Die organische Phase wurde über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel wurde am Rotationsverdampfer abdestilliert. Man erhielt 91 mg (98 %) der gewünschten Titelverbindung.


20 HPLC (Bedingungen wie bei Beispiel 1A): $R_t = 3.28$ min.

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz in $\text{D}_6\text{-DMSO}$) $\delta = 1.21\text{--}1.85$ (m, 5H), 2.64 (m, 4H), 2.85 (m, 1H), 3.05 (m, 1H), 3.89 (m, 1H), 5.34 (s, breit, 2H), 6.78 (dd, 1H), 7.15 (m, 1H), 7.60 (d, 1H), 8.13 (d, 1H).

MS (ESI⁺): $m/z = 372$ $[\text{M}+\text{H}]^+$

Ausführungsbeispiele:Beispiel 1

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-6-chinolincarboxamid Hydrochlorid



HCl

5

Zu einer Lösung von 182 mg (1,05 mmol) Chinolin-6-carbonsäure und Diisopropyl-ethylamin (620 mg, 4,8 mmol) in 4mL DMF wird bei RT zunächst 319 mg (0,99 mmol) TBTU und 137 mg (1,01 mmol) HOBt gegeben, anschließend wird 200 mg (1,0 mmol) 3-Aminochinuclidindihydrochlorid zugegeben. Das Gemisch wird 4h bei RT gerührt. Zur Aufarbeitung wird eingeeengt und in einer Mischung aus Chloroform und überschüssiger wässriger NaOH aufgenommen. Die Phasen werden getrennt und die wässrige Phase mehrmals mit Chloroform nachextrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, eingeeengt und das Rohprodukt an Kieselgel gesäult (Laufmittel, Chloroform:Methanol: konz. NH₃ = 100:20:4). Das erhaltene Produkt wird in THF aufgenommen, mit überschüssigem HCl in Diethylether versetzt, eingeeengt und am Hochvakuum getrocknet. Man erhält 136 mg (47% Ausbeute) des Hydrochlorids.

15


¹H-NMR (300 MHz, CD₃OD) δ = 9,30 (m, 2H); 8,95 (s, 1H); 8,60 (d, 1H), 8,32 (d, 1H); 8,15 (m, 1H); 4,55 (m, 1H), 3,85 (m, 1H); 3,60-3,30 (m, 5H); 2,50-1,90 (m, 5H).

20

MS (ESI+): m/z = 282 ([M+H]⁺ der freien Base)

Beispiel 2

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-phenazincarboxamid




5

Hergestellt analog der Arbeitsvorschrift für Beispiel 1 ausgehend von 236 mg Phenazin-2-carbonsäure und 200 mg 3-Aminochinuclidindihydrochlorid. Nach chromatographischer Trennung wurden 84 mg (25 % Ausbeute) der freien Base erhalten.

10 $^1\text{H-NMR}$ (in DMSO-d_6) δ = 8,85 (s, 1H); 8,75 (d, J = 7Hz, 1H); 8,30 (m, 4H); 8,00 (m, 2H); 4,05 (m, 1H); 3,2-2,7 (m, 6H); 2,0-1,3 (m, 5H).
MS (ESI+): m/z = 333 $[\text{M}+\text{H}]^+$

Beispiel 3

15 N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-7-chinolincarboxamid Hydrochlorid




Hergestellt analog der Arbeitsvorschrift für Beispiel 1 ausgehend von 183 mg Chinolin-7-carbonsäure (Seibert et al. *J. Am. Chem. Soc.* 1946, 68, 2721) und 200 mg 3-Aminochinuclidindihydrochlorid. Es wurden 227 mg (71 % Ausbeute) des Hydrochlorids erhalten.

20 $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz in DMSO-d_6) δ = 10,5 (s, 1H); 9,15 (m, 2H); 8,70 (m, 2H), 8,20 (m, 2H); 7,80 (m, 1H); 4,40 (m, 1H); 3,65 (m, 1H), 3,45-3,10 (m, 5H); 2,30-1,65 (m, 5H).

MS (ESI+): m/z = 282 $[(\text{M}+\text{H})]^+$ der freien Base)

Beispiel 4

N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-6-chinolincarboxamid Hydrochlorid




HCl

Hergestellt analog Beispiel 1 ausgehend von (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylamin.
Die ¹H-NMR und MS-Daten waren identisch zu Beispiel 1.

Beispiel 5

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-ethyl-7-chinolincarboxamid



Eine Lösung von 30 mg (0,08 mmol) des Beispiels 4A, 0,32 mmol 1-Penten-3-ol,
0,5 mg (10 mol%) Palladium(II)acetat, 22,4 mg (0,08 mmol) Tetrabutylammonium-
chlorid, 0,6 mg (10 mol%) Tri-tertbutylphosphin und 28 mg (0,20 mmol) Kalium-
carbonat in 2 ml DMF wurde in einer Argonatmosphäre 72 h bei 100°C gerührt. Das
Lösungsmittel wurde abdestilliert und der Rückstand wurde in Methanol aufge-
nommen. Es wurde über Dickschicht-Chromatographie gereinigt (Laufmittel:
Dichlormethan / Methanol / Triethylamin 80:20:2).
Man erhielt die Titelverbindung in 12 % Ausbeute.

HPLC (Bedingungen wie bei Beispiel 1A): Rt = 3,00 min.


$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz in $\text{D}_6\text{-DMSO}$) δ = 1,35 (t, 3H), 1,21-2,01 (m, 5H), 2,96 (q, 2H), 2,82-3,12 (m, 5H), 4,11 (m, 1H), 7,52 (d, 1H), 7,95 (m, 2H), 8,31 (d, 1H), 8,54 (s, 1H), 8,64 (d, 1H).

MS (ESI+): m/z = 310 $[\text{M}+\text{H}]^+$

5

Beispiel 6

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-ethyl-6-chinolincarboxamid



10 In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 2A mit 1-Penten-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 36 % Ausbeute.

LC/MS (Kromasil RP-18, 5 μm , 2,1x150 mm, Eluent = A: Acetonitril B: H_2O + 0,23 g 30%ige HCl / 1 Wasser; Gradient = 0 – 2,5 min 2 % A – 95 % A; 2,5 – 5 min 95 % A; Fluß = 0,9 mL/min; Temp.: 70°C, UV Detektion bei 210 nm): R_t =


15 1,71 min; MS (ESI+): m/z = 310 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz in $\text{D}_6\text{-DMSO}$) δ = 1,32 (t, 3H), 1,25-2,22 (m, 5H), 2,76 (m, 4H), 2,97 (m, 5H), 4,06 (m, 1H), 7,52 (d, 1H), 7,98 (d, 1), 8,12 (dd, 1H), 8,36 (d, 1H), 8,43 (s, 1H), 8,52 (d, 1H).

20

Beispiel 7

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-methyl-7-chinolincarboxamid




In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 4A mit 1-Buten-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 21 % Ausbeute.

5 LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,70$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 296$ $[M+H]^+$.

¹H-NMR (400 MHz in D₆-DMSO) $\delta = 1,38$ - $1,99$ (m, 5H), 2,68 (s, 3H), 2,82 (m, 4H), 3,01 (m, 1H), 4,10 (m, 1H), 7,50 (d, 1H), 7,96 (m, 2H), 8,30 (d, 1H), 8,51 (s, 1H), 8,60 (s, 1H).

10 **Beispiel 8**

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-methyl-6-chinolincarboxamid




15 In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 2A mit 1-Buten-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 29 % Ausbeute.

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 0,57$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 296$ $[M+H]^+$.

20 **Beispiel 9**

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-4-methyl-6-chinolincarboxamid




In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 2A mit 2-Butin-1-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 8 % Ausbeute.

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 0,56$ min; MS (ESI⁺): $m/z =$
5 296 $[M+H]^+$.

Beispiel 10

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-propyl-6-chinolincarboxamid



10

In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 2A mit 1-Hexen-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 23 % Ausbeute.


LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,77$ min; MS (ESI⁺): $m/z =$
15 324 $[M+H]^+$.

¹H-NMR (400 MHz in D₆-DMSO) $\delta = 0,95$ (t, 3H), 1,24-1,65 (m, 4H), 1,85 (m, 4H),
2,70 (m, 3H), 2,91 (m, 3H), 3,15 (m, 1H), 4,01 (m, 1H), 5,76 (m, 1H), 7,50 (d, 1H),
7,96 (m, 1H), 8,12 (d, 1H), 8,38 (d, 1H), 8,47 (m, 2H).

20

Beispiel 11

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-ethyl-4-methyl-6-chinolincarboxamid




In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 2A mit 2-Hexin-4-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 16 % Ausbeute.

5 LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 2,06$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 324$ $[M+H]^+$.

¹H-NMR (400 MHz in D₆-DMSO) $\delta = 1,31$ (t, 3H), 1,61 (m, 2H), 1,90 (m, 2H), 2,71 (m, 8H), 2,91 (m, 4H), 3,17 (m, 1H), 4,01 (m, 1H), 7,39 (s, 1H), 7,95 (d, 1H), 8,13 (m, 1H), 8,49 (m, 2H).

10 **Beispiel 12**

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-propyl-7-chinolincarboxamid




15 In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 4A mit 1-Hexen-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 12 % Ausbeute.

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,73$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 324$ $[M+H]^+$.

20 ¹H-NMR (400 MHz in D₆-DMSO) $\delta = 0,96$ (t, 3H), 1,38 (m, 1H), 1,63 (m, 2H), 1,87 (m, 5H), 2,75 (m, 5H), 2,93 (m, 3H), 3,20 (m, 1H), 4,05 (m, 1H), 7,50 (d, 1H), 7,96 (m, 2H), 8,30 (m, 1H), 8,54 (s, 1H), 8,61 (d, 1H).

Beispiel 13

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-ethyl-4-methyl-7-chinolincarboxamid



5

In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 4A mit 2-Hexin-4-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 15 % Ausbeute.


LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,73 \text{ min}$; MS (ESI⁺): $m/z = 324 [M+H]^+$.

¹H-NMR (400 MHz in D₆-DMSO) $\delta = 1,32 \text{ (t, 3H)}$, $1,60 \text{ (m, 2H)}$, $1,85 \text{ (m, 1H)}$, $2,70 \text{ (m, 8H)}$, $2,92 \text{ (m, 4H)}$, $3,12 \text{ (m, 1H)}$, $4,02 \text{ (m, 1H)}$, $7,40 \text{ (s, 1H)}$, $7,97 \text{ (d, 1H)}$, $8,10 \text{ (d, 1H)}$, $8,53 \text{ (m, 1H)}$, $8,59 \text{ (d, 1H)}$.

15

Beispiel 14

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-4-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-6-chinolincarboxamid



In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 2A mit 3-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-propin-1-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 12 % Ausbeute.


20

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,78$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 366$ $[M+H]^+$.

¹H-NMR (400 MHz in D₆-DMSO) $\delta = 1,22-2,05$ (m, 13H), 2,71 (m, 5H), 2,90 (m, 2H), 3,17 (m, 1H), 3,76 (m, 1H), 4,00 (m, 1H), 4,16 (m, 1H), 5,18 (d, 1H), 7,60 (d, 1H), 8,05 (d, 1H), 8,18 (d, 1H), 8,52 (s, 1H), 8,94 (d, 1H).

Beispiel 15

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-4-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-7-chinolincarboxamid




In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 4A mit 3-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-propin-1-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 9 % Ausbeute.

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,92$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 366$ $[M+H]^+$.

Beispiel 16

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-phenyl-6-chinolincarboxamid




- 5 Gemäß der allgemeinen Vorschrift wurden Zwischenstufe 2 mit 3-Phenyl-1-propen-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 38 % Ausbeute.

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,94$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 358$ $[M+H]^+$.

10

Beispiel 17

N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2-phenyl-7-chinolincarboxamid




- 15 In Analogie zur Vorschrift für Beispiel 5 wurde Beispiel 4A mit 3-Phenyl-1-propen-3-ol umgesetzt. Man erhielt die Titelverbindung in 24 % Ausbeute.

LC/MS (Bedingungen wie bei Beispiel 6): $R_t = 1,95$ min; MS (ESI⁺): $m/z = 358$ $[M+H]^+$.

20

Patentansprüche

1. Verbindungen der allgemeinen Formel (I),



in welcher

R^1 für einen Aza-bicyclo[m.n.o]alkyl-Rest mit 7 bis 11 Ringatomen steht, worin m, n und o gleich oder verschieden sind und 0, 1, 2 oder 3 bedeuten, und wobei der Rest gegebenenfalls durch (C₁-C₆)-Alkyl substituiert ist,

der Ring A für Pyrimido steht, oder

für gegebenenfalls Benzo-kondensiertes Pyrido, Pyridazo oder Pyridazino steht,

und

R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Reste ausgewählt aus der Gruppe Wasserstoff, Halogen, Formyl, Carbamoyl, Cyano, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Nitro, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₁-C₆)-Alkylthio, (C₃-C₈)-Cycloalkyl, 4- bis 8-gliedriges Heterocyclyl, Phenyl oder 5- bis 6-gliedriges Heteroraryl stehen, wobei Phenyl und Heteroraryl gegebenenfalls durch Halogen, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, Amino, Mono- oder Di-(C₁-C₄)-Alkylamino, (C₁-C₄)-Alkanoylamino oder (C₁-C₄)-Alkansulfonylamino substituiert sind,

und deren Salze, Hydrate und/oder Solvate.

2. Verbindungen nach Anspruch 1, wobei

5

R^1 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat,

der Ring A zusammen mit dem ankondensierten Benzolrest für Chinolin-5-yl
oder Chinolin-6-yl steht,

10

und

R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Reste ausgewählt aus der
Gruppe Wasserstoff, Halogen, Cyan, Trifluormethyl, Methyl und
Ethyl stehen,

15

und deren Salze, Hydrate und/oder Solvate.

3. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2, wobei

20

R^1 für 1-Aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl steht,

und der Ring A, R^2 und R^3 die in Anspruch 1 oder 2 angegebene Bedeutung
haben,

25


und deren Salze, Hydrate und/oder Solvate.

4. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man

30

Verbindungen der allgemeinen Formel (II),


- 36 -



in welcher R^1 die oben genannte Bedeutung hat,

5

mit einer Verbindung der allgemeinen Formel (III),



in welcher

10

der Ring A, R^2 und R^3 die oben genannte Bedeutung haben, und

X für Hydroxy oder eine geeignete Abgangsgruppe steht,

15

in einem inerten Lösungsmittel gegebenenfalls in Gegenwart eines Kondensationsmittels und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base umsetzt.

5. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten.

20

6. Arzneimittel enthaltend mindestens eine der Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3 in Zusammenmischung mit mindestens einem pharmazeutisch verträglichen, im wesentlichen nichtgiftigen Träger oder Exzipienten.

25

7. Verwendung von Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Herstellung eines Arzneimittels zur Verbesserung der Wahrnehmung, Konzentrationsleistung, Lernleistung und/oder Gedächtnisleistung.

8. Verwendung von Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Störungen der Wahrnehmung, Konzentrationsleistung, Lernleistung und/oder Gedächtnisleistung.

5

9. Arzneimittel nach Anspruch 6 zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Störungen der Wahrnehmung, Konzentrationsleistung, Lernleistung und/oder Gedächtnisleistung.

10